



## PODODERMATITE DE CONTATO E OS PREJUÍZOS NA CRIAÇÃO DE AVES DE CORTE

Cristiano Meneghini<sup>1</sup>, Gilberto Procopio Marques<sup>1</sup>, Gustavo Basso dos Santos<sup>1</sup>,  
Maurício Lemes Erthal<sup>1</sup>, Cesar Junior Menezes Hasse<sup>1</sup>, Cecilia Gabriela Rubert Possenti<sup>2</sup>

**Resumo:** A pododermatite atinge a região plantar das aves, sendo um tipo de inflamação que afeta diretamente o coxim plantar da mesma, causando necrose da área afetada e assim comprometendo os movimentos articulares da região tarsal, são vários os fatores que podem ser responsáveis pelo aparecimento desta inflamação, sendo o principal deles, a falta de manutenção apropriada da cama aviária. Esta cama necessita estar em perfeitas condições para que o surgimento da dermatite seja minimizado, sendo assim o aviário precisa ser bem ventilado, pois o ar deve circular por toda sua extensão evitando assim o emplastamento da cama aviária, controlando a umidade relativa do ar que precisa encontrar-se entre 50 a 70%. É de grande importância que a umidade retida na cama seja evitada, pois quanto mais úmida for mais se aderem a região do coxim plantar, aumentando a probabilidade do surgimento da dermatite. A composição da ração disponibilizada no aviário precisa ter uma formulação adequada, pois influencia diretamente nas fezes das aves, as quais estão diretamente ligadas à umidade retida na cama, portanto o bom funcionamento do sistema digestório das aves necessita ser levado em consideração. Além de ser uma grande porta de entrada para vírus, bactérias e fungos essa enfermidade compromete diretamente o ganho de peso do plantel, afetando a produção aviária, pois a locomoção da ave é afetada pelo desconforto causado no surgimento de úlceras no coxim plantar das aves, podendo comprometer todo movimento articular da região, impossibilitando assim que a ave tenha acesso ao comedouro e bebedouro, aspecto que também está ligado diretamente ao bem estar animal. O tratamento curativo em aves acometidas desta dermatite consiste em limpeza diária da área afetada, removendo a pele necrosada, utilizando pomadas a base de penicilina G, benzatina e principalmente a base de ureia que é excelente para remoção de tecido necrosado, sendo o uso de antibiótico na água também aconselhado para auxiliar no tratamento. Sabe-se da grande importância econômica do mercado de importação avícola em nosso país, sendo assim a prevenção desta pododermatite torna-se, pois cabe aos produtores e proprietários de granjas avícolas estarem atentos ao manejo correto dos aviários, desenvolvendo novas práticas, assegurando uma maior qualidade e um menor índice de desperdícios de partes comprometidas pela doença, aumentando assim a produção e importação de carnes de aves.

**Palavras-chave:** Avicultura. Patologia. Prevenção. Tratamento.

<sup>1</sup> Discentes do curso de Medicina Veterinária, da Faculdade Santo Ângelo - FASA, Santo Ângelo, Brasil. E-mail: cr\_meneghini@hotmail.com, gilbertopromarques@gmail.com, gustavobassodossantos@hotmail.com, mauricioleralth@yahoo.com.br, junior\_hasse10@hotmail.com

<sup>2</sup> Docente da Faculdade Santo Ângelo - FASA, Santo Ângelo, Brasil. E-mail: ceciliapossenti@sejafasa.com.br